

# Facetinfiltratie

## Bepaling

- punctie van één of meerdere facetgewrichten (achterste interapofysaire gewrichten van de wervelzuil) voor injectie van corticoiden en/of lokaal anestheticum. Dit kan geschieden onder radiografische of CT-grafische controle naargelang de voorkeur van de arts

## Vorbereiding

- zwanger?
- de infiltratie gebeurt op afspraak
- u hoeft niet nuchter te zijn

## Verloop van het onderzoek

- bovenkledij wordt verwijderd
- patient wordt in buiklig op de radiografietafel of CT geplaatst.
  - radiografie: onder radioscopische geleiding
  - CTscan: er wordt een eerste serie sneden doorheen de gevraagde zone uitgevoerd. Op de monitor bepaalt de radioloog de optimale punctieplaats, en markeert deze met stift op de huid van de patient. De huid wordt ruim ontsmet. Er wordt lokaal verdoving toegediend. De naald(en) worden gepositioneerd. Door middel van gerichte sneden doorheen de zone wordt de positie van de naaldpunt met CTscan gecontroleerd, bijgesteld en terug gecontroleerd. Als de naald(en) correct in het gewricht zijn geplaatst spuit de radioloog een kleine hoeveelheid cortisone (en ev. een langwerkend lokaal anestheticum) in het gewricht. De naalden worden terug verwijderd
- het onderzoek duur 15 tot 30 minuten

## Indicaties en toepassingen

- facetarthrose
- diagnose en therapie van cyste van het facetgewricht

## Nazorg:

- er is geen nazorg, u mag alle activiteiten uitvoeren, u mag met de auto rijden
- in een beperkt aantal gevallen kunnen de pijnklachten kortstondig toenemen (vb door volumetoenames van een cyste van het facetgewricht door de vloeistofinjectie met toenemende druk op de zenuwwortels)