

## Galactografie

### Bepaling

- radiografie van de melkgangen van de borst na inspuiten van een kleine hoeveelheid contrastvloeistof in de tepelopening

### Vorbereiding

- zwanger?
- dit onderzoek gebeurt enkel op afspraak; alle vorige documenten (mammografie, ...) dienen vooraf in het bezit van de radioloog te zijn
- u hoeft niet nuchter te zijn

### Verloop van het onderzoek

- borst wordt bloot gemaakt
- patiënt wordt op een ligtafel geplaatst. De tepel wordt ontsmet
- de radioloog zoekt ter hoogte van de tepel de opening waaruit de vloeistof verschijnt. Hiervoor moet hij soms op meerdere plaatsen en vrij hard op de borst drukken.
- de radioloog plaatst een zeer dun naaldje in de verantwoordelijke opening. Gezien de kleine afmetingen van de openingen is dit een delicate en soms tijdrovende bezigheid. Na plaatsing van de catheter wordt een zeer kleine hoeveelheid contrastvloeistof in gespoten. Indien de melgang te sterk wordt gevuld voelt u toenemende spanning of pijn, u verwittigt hiervan de radioloog. Met de catheter ter plaatse of na afdichten van de opening met een spraykleefstof worden in zittende of staande houding met matige compressie 2 mammografische opnamen uitgevoerd. Deze opnamen worden bekeken door de radioloog
- eventueel dient nog wat te worden bijgespoten of aanvullende opnamen uitgevoerd

### Indicaties en toepassingen

- tepelverlies (vochtverlies uit de tepel) ter hoogte van één borst, vooral als uit één opening, bruin of bloederig
- opsporen van kleine letseltjes in de tepelgang