

Hysterografie - hysterosalpingografie

Bepaling

- radiografisch onderzoek van de binnenkant van de baarmoeder en de doorgankelijkheid van de eileiders na inspuiten van een contraststof

Vorbereiding

- zwanger?
- het onderzoek gebeurt op afspraak met de gynaecoloog
- u mag geen recent contrastonderzoek van de buik hebben ondergaan. Contrastresten in de darm kunnen de visualisatie van baarmoeder en eileiders verhinderen
- u hoeft niet nuchter te zijn

Verloop van het onderzoek

- u wordt gevraagd het onderlichaam volledig te ontkleden en vooraf uw blaas volledig te legen. U krijgt een verpleeghempdje aan
- het onderzoek gebeurt in gynaecologische houding op de radiografietafel. De gynaecoloog plaatst een speculum in de vagina en een dun buisje in de opening van de baarmoederhals. Onder radioscopische controle wordt door de gynaecoloog een kleine hoeveelheid contraststof in de holte van de baarmoeder en de eileiders ingespoten. Normaal gezien loopt deze contraststof door tot in de buikholte. Er worden radiografische opnamen gemaakt in verschillende richtingen
- de contraststof in de buikholte kan een lichte prikkeling van het buikvlies veroorzaken. Deze prikkeling verdwijnt vrij snel na het onderzoek

Indicaties en toepassingen

- infertiliteit - subfertiliteit, doorgankelijkheid van de eileiders, controle na sterilisatie

Nazorg

- geen



hysterografie met contrast in de baarmoeder en de eileiders