

# Afstelling van een maagbandje (gastric banding)

## Bepaling

- controle en afstellen van een maagbandje (maagverkleining) onder radioscopische controle

## Vorbereiding

- zwanger?
- u moet niet nuchter zijn

## Verloop van het onderzoek

- de thorax en buik worden ontbloot.
- het onderzoek wordt normaal in aanwezigheid van de behandelende chirurg uitgevoerd
- tijdens instructies van de radioloog drinkt u meerdere malen een slok contraststof. Radioscopisch wordt de snelheid van passage van dit contrast doorheen de opening van het bandje beoordeeld.
- indien nodig kan de diameter van het bandje worden gecorrigeerd. Dit geschiedt door via een reservoir onder de huid in de regio van de navel, vloeistof bij te spuiten of te aspireren waardoor de diameter van de opening verkleint of toeneemt. Hiervoor wordt de huid ontsmet en wordt onder radioscopische geleiding met een dunne naald het reservoir aangeprikt. Met de naald ter plaatse wordt de aanpassing gecontroleerd en zo nodig bijgesteld.
- duur van het onderzoek: ongeveer 10 minuten

## Indicaties en toepassingen

- controle van de passage doorheen een maagbandje geplaatst voor obesitas

## Nazorg

- geen bijzondere nazorg