

Slikfunctie

Bepaling

- radiografisch dynamisch onderzoek van de keel en bovenste slokdarm tijdens het drinken van een contraststof (barium)

Vorbereiding

- zwanger?
- u hoeft niet nuchter te zijn
- vooraf wordt gevraagd de hals te ontbloten, kunstgebit en juwelen (oorbellen, halsketting ..) te verwijderen

Verloop van het onderzoek

- er worden eerst 2 opnamen gemaakt zonder contraststof
- nadien wordt in zittende of staande houding meermalen gevraagd een slok contraststof in te nemen en in de mond te houden. Op vraag van de radioloog mag u de vloeistof doorslikken zonder het hoofd te bewegen. Dit wordt meermalen uitgevoerd in verschillende richtingen. Ondertussen worden radiografische opnamen en dynamische digitale videoregistraties gemaakt zodat alle fasen van de slikbeweging kunnen worden geanalyseerd
- duur van het onderzoek: ongeveer 10 minuten
- afhankelijk van de probleemstelling wordt dit onderzoek frequent samen met een onderzoek van de slokdarm of slokdarm, maag en duodenum uitgevoerd

Indicaties en toepassingen

- slikproblemen, gevoel dat eten blijft steken

Nazorg en opmerkingen

- zoals bij alle onderzoeken met bariumcontrast is de stoelgang daags nadien wit gekleurd. Bariumcontrast kan neiging tot constipatie (verstopping) veroorzaken. Daarom wordt aangeraden na het onderzoek gans de dag veel te drinken om de stoelgang te bevorderen